

# Elektromagnetické vlny

Maxwellove rovnice

Vlnové rovnice

Rovinová vlna

Kulová vlna

Vlnové rovnice v materiálovom prostredí

Rýchlosť a smer šírenia vlny

Energia vlny

## Polarizačia monochromatickej vlny

Polarizačná elipsa

Jonesov formalizmus

Priprava polarizovaného svetla

Polarizačné zariadenia

## Odráz a lom

Zákon odrázu a lomu

Fresnelove vzorce

Výkonné koeficienty a energetická bilance

Optický hustejšie prostredie

Optický redeliteľ prostredie

## Interference

Dvousazhová interference rovinnych vln

Michelsonov interferometer

Planparallelní destička

Nekolineárne vlnové vektory

Interferenční proužky

Interference mnoha vln

Dve vlny rôznej frekvencie

Grupová a fázová rýchlosť

## Difrakce

Difrakční integrál

Fresnelova approximace

Fraunhofova approximace

Intenzita na priamke kruhoveho otvoru

Babinetov princíp

Difrakce na hrane

Difrakce na štrbine

Difrakce na obdlníku

Rayleighovo kritérium

Amplitudová difrakční mřížka

Difrakční rovnice

Holografie

## Koherence

Popis koherence

Časová koherence

Prostorová koherence

## Geometrická optika

Eikonař

Eikonalová rovnice

Paprsková rovnica

Lagrangeov invariant

Fermatov princip

Descartesové plochy

Paraxialní optika

Gaussova zobrazovací rovnice

Maticová optika

Zváčšení

Optické prístroje

## Anizotropné prostredie

Základný popis

Fresnelova rovnica

Poyntingov vektor

Lom svetla

Použitie

Indikatrix

## Vláknová optika

Vedenie vlny

Módy

Účin

## Nelineárna optika

2. rádu

3. rádu

## Interakce záření s hmotou

Základný popis

Fresnelovy koeficienty

Poyntingov vektor

Lorentzov model

Drudeho model

## Záření černého tělesa

Základní popis

Wienov zákon

Rayleighov - Jeansův zákon

Plackov zákon

# Elektromagnetické vlny

## Maxwellové rovnice

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= \frac{S}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{D} &= S \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\end{aligned}$$

## Vlnová rovnice

- obecná:  $\frac{\partial^2}{\partial x^2} M = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 M}{\partial t^2}$

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) M = 0 \quad \rightarrow \quad \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} \right) M = 0$$

označme  $\xi_1 = x - vt$        $\frac{\partial}{\partial t} = -v \frac{\partial}{\partial \xi_1} + v \frac{\partial}{\partial \xi_2}$   
 $\xi_2 = x + vt$        $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi_1} + \frac{\partial}{\partial \xi_2}$

potom  $\frac{\partial^2 M}{\partial \xi_1 \partial \xi_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad M = f(\xi_1) + g(\xi_2) = f(x-vt) + g(x+vt)$

## Rovinová vlna

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_0 \cos(\vec{k}(\vec{r}-\vec{v}t) + \delta) = \vec{E}_0 \cos(\vec{k}(\vec{r}-\vec{v}t) + \underbrace{\delta}_{\text{fáze}}) = \vec{E}_0 \cos(\underbrace{\vec{k} \cdot \vec{r} - \vec{k} \cdot \vec{v} t + \delta}_{\text{počin fáze}})\end{aligned}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \omega = 2\pi f = \vec{k} \cdot \vec{v} = kv$$

$$\vec{s}_0 = \frac{\vec{k}}{k} \quad \vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{s}_0 \quad \vec{s}_0 \cdot \vec{r} = \text{konst.} \rightarrow \text{rovinná vlna}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \delta)} \quad \rightarrow \text{cplx výjádření}$$

## Kulová vlna

→ vznik napr. osciláciou dipólu :  $p(t) = p_0 e^{-i\omega t}$

$$P_{e_0 \epsilon} = \frac{\mu_0 P_0^2 \omega^4}{12 \pi c} \rightarrow \text{vyčítavaný výkon dipólam}$$

$$\nabla^2 \Psi(r) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \Psi(r)}{\partial r} \right) \rightarrow \text{pre sféricky symetrickú funkciu } \Psi(r)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \Psi(r)}{\partial r} \right) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \epsilon^2} \rightarrow \text{substitúcia } \Psi = \frac{1}{r} \varphi$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( -\varphi + r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = \frac{1}{c^2} \frac{1}{r} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \epsilon^2}$$

$$\cancel{\frac{1}{r^2}} \left( -\cancel{\frac{\partial \varphi}{\partial r}} + \cancel{\frac{\partial \varphi}{\partial r}} - r \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} \right) = \frac{1}{c^2} \cancel{\frac{1}{r}} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \epsilon^2} \rightarrow \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \epsilon^2}$$

$$\Rightarrow \varphi = A e^{i(kr \pm \omega t)} \rightarrow \Psi = \frac{A}{r} e^{i(kr \pm \omega t)}$$

## Vlnová rovnica v materiálovom prostredí

- dominujúca elektrická súčasťka

- nemagnetická approximácia  $\vec{B} \approx \mu_0 \vec{H}$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial \epsilon} \xrightarrow{\quad} \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_f + \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial \epsilon} , \text{ kde } \vec{D} = \epsilon \vec{E} + \vec{P}$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \nabla \times \vec{E} &= \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \nabla(\epsilon_f + \epsilon_p) - \nabla^2 \vec{E} = \frac{\nabla \epsilon_f}{\epsilon_0} + \frac{\nabla \epsilon_p}{\epsilon_0} - \nabla^2 \vec{E} \\ &= -\frac{\partial}{\partial \epsilon} (\nabla \times \vec{B}) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial \epsilon} \vec{j}_f - \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial \epsilon^2} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}_f}{\partial \epsilon} - \mu_0 \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial \epsilon^2} - \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial \epsilon^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial \epsilon^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{j}_f}{\partial \epsilon} + \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial \epsilon^2} + \frac{\nabla \epsilon_f}{\epsilon_0} + \frac{\nabla \epsilon_p}{\epsilon_0} \xrightarrow{\epsilon_p = -\nabla \cdot \vec{P}} \epsilon_p = -\nabla \cdot \vec{P}$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial \epsilon^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{j}_f}{\partial \epsilon} + \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial \epsilon^2} + \frac{\nabla \epsilon_f}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon_0} \nabla(\nabla \cdot \vec{P})$$

- neodivé:  $\oint \vec{f} = 0$ ,  $\vec{j}_F = 0$
- izotropné:  $\nabla(D \cdot \vec{P}) = 0$
- nemagnetické:  $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$  ( $M = 0$ )
- linearní:  $\vec{P} = \epsilon_0 \chi(\omega) \vec{E} = \epsilon_0 (\epsilon_r(\omega) - 1) \vec{E}$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\epsilon_0 \epsilon_r(\omega) \vec{E}) - \cancel{\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}}$$

$$\nabla^2 \vec{E} = \underbrace{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r(\omega)}_{\frac{1}{v^2(\omega)}} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

## Rychlosť a smér sŕieni'

• fázová rýchlosť sŕieni:  $v(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r(\omega)}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r(\omega)}} = \frac{c}{n(\omega)}$

$$n(\omega) = \sqrt{\epsilon_r(\omega)} = \frac{c}{v(\omega)} \geq 1 \quad k(\omega) = \frac{n(\omega) \omega}{c} \quad \lambda(\omega) = \frac{\lambda_0(\omega)}{n(\omega)}$$

$$\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t = k(\vec{s}_0 \cdot \vec{r} - vt), \text{ označme } \xi = \vec{s}_0 \cdot \vec{r} - vt$$

$$\rightarrow \text{potom } \frac{\partial}{\partial x^i} = \frac{d\xi}{dx^i} \frac{\partial}{\partial \xi} = s_{0i} \frac{\partial}{\partial \xi} \quad \frac{\partial}{\partial t} = \frac{d\xi}{dt} \frac{\partial}{\partial \xi} = -v \frac{\partial}{\partial \xi}$$

$$\Rightarrow \nabla_x \vec{E} = \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x^j} E_k = \epsilon_{ijk} s_{0i} \frac{\partial}{\partial \xi} E_k = \vec{s}_0 \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial \xi} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = v \frac{\partial \vec{B}}{\partial \xi}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial \xi} (\vec{s}_0 \times \vec{E}) = \frac{\partial}{\partial \xi} (v \vec{B}) \Rightarrow \vec{s}_0 \times \vec{E} = v \vec{B}$$

$$\vec{s}_0 \times \vec{s}_0 \times \vec{E} = \vec{s}_0 (\vec{s}_0 \cdot \vec{E}) - \vec{E} (\vec{s}_0 \cdot \vec{s}_0) = v \vec{s}_0 \times \vec{B}$$

$$\Rightarrow \vec{s}_0 \times \vec{B} = -\frac{1}{v} \vec{E}$$

# Energia vlny

$$M_E = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 \quad M_B = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} = \frac{1}{2 \mu_0} B^2$$

$$B = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} E \Rightarrow B^2 = \epsilon_r \mu_0 \epsilon_r E^2 \Rightarrow M_B = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2$$

$$\Rightarrow M = M_E + M_B = \epsilon_0 \epsilon_r E^2 = \epsilon_0 \epsilon_r V \vec{E} \cdot \vec{B}$$

↳ pre vlnu v tvare  $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$  je  $\langle M_E \rangle = \frac{1}{4} \epsilon_0 \epsilon_r E_0^2$

→ celková hustota energie potom:

$$U = \langle M_E \rangle + \langle M_B \rangle = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2} E_0^2$$

$$\rightarrow záření výkon \quad \langle c u \rangle = \langle \epsilon_0 E^2 c \rangle$$

Poyntingov vektor:

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

$$E \neq konst \text{ na } B \Rightarrow S = \frac{1}{\mu_0} E B = \frac{1}{\mu_0 V} E^2$$

$$\Rightarrow \langle S \rangle = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{\mu_0 V} = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{\mu_0} \frac{n}{c} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c n E_0^2$$

$$\rightarrow definujeme intenzitu vlny: I := \langle S \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c n E_0^2$$

# Polarizace monochromatické vlny

## Polarizačná elipsa

- zvolme vlnu v tvare

$$\begin{aligned} E_x &= \alpha_x e^{i(kz - \omega t)} \\ E_y &= \alpha_y e^{i(kz - \omega t - \delta)} \end{aligned} = \left. \begin{aligned} \alpha_x \cos(kz - \omega t) \\ \alpha_y \cos(kz - \omega t - \delta) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{eliptický} \\ \text{válec} \end{array}$$

→ v závislosti na  $\alpha_x, \alpha_y, \delta$  dostaneme rôzne druhy polarizácií:


$$E_y = \alpha_y \cos(kz - \omega t) \cos \delta + \alpha_y \sin(kz - \omega t) \sin \delta$$

$$\frac{E_y}{\alpha_y} = \frac{E_x \cos \delta}{\alpha_x} + \sqrt{1 - \left( \frac{E_x}{\alpha_x} \right)^2} \sin \delta$$

$$\left( \frac{E_y}{\alpha_y} \right)^2 + \left( \frac{E_x}{\alpha_x} \right)^2 \cos^2 \delta - 2 \frac{E_y}{\alpha_y} \frac{E_x}{\alpha_x} \cos \delta = \sin^2 \delta - \sin^2 \delta \left( \frac{E_x}{\alpha_x} \right)^2$$


$$\left( \frac{E_y}{\alpha_y} \right)^2 - 2 \frac{E_y}{\alpha_y} \frac{E_x}{\alpha_x} \cos \delta + \left( \frac{E_x}{\alpha_x} \right)^2 = \sin^2 \delta$$

- $\delta = \pm \frac{\pi}{2}, \alpha_x = \alpha_y \rightarrow$  kruhovo polarizované
- $\delta = 0 \rightarrow$  lin. polarizované
- Obecné elipsa



# Jonesov formalizmus

- polarizačný stav = vektor
- optické pravidlo meniace polarizáciu = matice
- platí len pre úplne polarizované svetlo



$$\sin \delta = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2}} \quad \cos \delta = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2}}$$

$$E_x = a_x e^{i\varphi} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \cos \delta e^{i\varphi}$$

$$E_y = a_y e^{i(\varphi-\delta)} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \sin \delta e^{-i\delta} e^{i\varphi}$$

$$\vec{E} = E_{\text{ef}} \begin{pmatrix} \cos \delta \\ \sin \delta e^{-i\delta} \end{pmatrix} e^{i\varphi} = E_{\text{ef}} \vec{J} e^{i\varphi}$$


$$\vec{J} = \begin{pmatrix} \cos \delta \\ \sin \delta e^{-i\delta} \end{pmatrix} \rightarrow \text{Jonesov vektor, } |\vec{J}| = 1$$

$$\langle \mu_E \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_{\text{ef}}^2$$

- špeciálne prípady:
- |  |                   |
|--|-------------------|
| $\vec{J} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ | $\rightarrow RCP$ |
| $\vec{J} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$  | $\rightarrow LCP$ |

## Príprava polarizovaného stavu

- lineárny dvojstav



- odraz

od povrchu, pre  
 $\text{tg } \Theta_{\text{cr}} = \frac{n_2}{n_1}$   
 Brew. uhol

- dichroismus

- v jednom smere  
 je  $\vec{E}$  absorbované  
 $\rightarrow$    
 $\vec{E}$  knihostomer

# Polarizačné zariadenia

## • rotátor

$$T = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

## • polarizačor

$$\rightarrow \text{projektie na vektor } \vec{p} = \begin{pmatrix} \cos\beta \\ \sin\beta \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow T$  je projekčná matice:

$$T = \begin{pmatrix} \cos\beta \\ \sin\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\beta & \sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2\beta & \sin\beta \cos\beta \\ \sin\beta \cos\beta & \sin^2\beta \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$  nechť  $\vec{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  a  $E_y = E_0 \cos\gamma e^{i\phi}$  je polarizované svetlo, kde  $\gamma$  je smer, meraný od  $\vec{p}$

$$\bullet I = \frac{1}{2} \epsilon_0 n c E_0^2 \cos^2\gamma = I_0 \cos^2\gamma$$

$\rightarrow$  ak máme nepolarizované svetlo a  $\gamma \in [0, 2\pi]$ , tak pre celk. intenzitu platí:

$$I = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} I_0 \cos^2\gamma d\gamma = \frac{I_0}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\gamma \right) d\gamma = \frac{I_0}{2}$$

$\Rightarrow$  pre obecné nepolarizované svetlo polarizačor preplní polovicu  $I$

## • fázová destička

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_g - n_x) d \quad \rightarrow \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}$$

# Odraž a lom


## Zákon odražu a lomu

- z Maxwellových rovnic plyní:

$$(1) \vec{E}_{i, \text{teora}} + \vec{E}_{r, \text{teora}} = \vec{E}_{e, \text{teora}}$$

$$(2) \vec{H}_{i, \text{teora}} + \vec{H}_{r, \text{teora}} = \vec{H}_{e, \text{teora}}$$

rovinu dopadu



$$\rightarrow z (1) \text{ dostaneme: } \vec{k}_i \cdot \vec{r} - \omega_i t = \vec{k}_r \cdot \vec{r} - \omega_r t = \vec{k}_e \cdot \vec{r} - \omega_e t$$


$$\text{"porovnáním časových koef. dostaneme: } \omega_i = \omega_r = \omega_e$$

$$\text{"porovnáním poloh koef. ---: } \vec{k}_i \cdot \vec{r}_B = \vec{k}_r \cdot \vec{r}_B = \vec{k}_e \cdot \vec{r}_B$$

$$\rightarrow \vec{r}_B \text{ je vektor v xy rovine: } \vec{r}_B = (x_1, y_1, 0)$$

$$\rightarrow \vec{k}_i = (k_{ix}, 0, 0) \Rightarrow k_{ix} x = k_{rx} x + k_{ry} y = k_{tx} x + k_{ty} y$$

$$\Rightarrow \text{porovnaním koef dostaneme } k_{ry} = k_{ty} = 0 \Rightarrow \vec{k}_i, \vec{k}_r, \vec{k}_e \text{ v 1 rovine}$$



$$k_{ix} = k_{rx} \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} n_1 \sin \theta_i = \frac{2\pi}{\lambda} n_1 \sin \theta_r$$


$$\Rightarrow \sin \theta_i = \sin \theta_r \Rightarrow \theta_i = \theta_r$$

$$k_{ix} = k_{tx} \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} n_1 \sin \theta_i = \frac{2\pi}{\lambda} n_2 \sin \theta_e$$

$$\Rightarrow n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_e$$

## Fresnelove vzorce

- s-polarizace = kolmo na rovinu dopadu:  $\vec{E}_i = (0, E_{iy}, 0)$



$$\vec{k}_i = (k_{ix}, 0, k_{iz}) = k (\sin \theta_i, 0, \cos \theta_i)$$

platí:  $\vec{s}_o \times \vec{E}_i = v \vec{B}_i = \frac{c}{n_1} \vec{B}_i$ , kde  $\vec{s}_o = \frac{\vec{k}_i}{k} = (\sin \theta_i, 0, \cos \theta_i)$

$$\Rightarrow \vec{B}_i = \frac{n_1}{c} \vec{s}_o \times \vec{E}_i = \frac{n_1}{c} E_{iy} (-\cos \theta_i, 0, \sin \theta_i)$$

$$\vec{B}_t = \frac{n_2}{c} \vec{s}_o \times \vec{E}_t = \frac{n_2}{c} E_{ty} (-\cos \theta_t, 0, \sin \theta_t)$$

$$\vec{B}_r = \frac{n_1}{c} \vec{s}_o \times \vec{E}_r = \frac{n_1}{c} E_{ry} (\cos \theta_t, 0, \sin \theta_t)$$

- zo spojnosti:  $B_{ix} + B_{rx} = B_{tx}$   $E_{iy} + E_{ry} = E_{ty}$

$$\Rightarrow -\cos \theta_i n_1 E_{iy} + \cos \theta_t n_1 E_{ry} = -n_2 E_{ty} \cos \theta_t = -n_2 (E_{iy} + E_{ry}) \cos \theta_t$$

$$-\cos \theta_i n_1 + \cos \theta_t n_1 \frac{E_{ry}}{E_{iy}} = -n_2 \cos \theta_t - n_2 \frac{E_{ry}}{E_{iy}} \cos \theta_t$$

definujme:  $r_s = \frac{E_{ry}}{E_{iy}} = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} = \frac{\sin(\theta_t - \theta_i)}{\sin(\theta_t + \theta_i)}$

$$t_s = \frac{E_{ty}}{E_{iy}} = r_s + 1$$

- p-polarizace

$$r_p = \frac{E_r}{E_i} = \frac{n_1 \cos \theta_t - n_2 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_i} = \frac{t_g(\theta_t - \theta_i)}{t_g(\theta_t + \theta_i)}$$

$$t_s = (r_s + 1) \frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i}$$

# Výkonové koeficienty a energetická bilance


- intenzita jednotlivych vln sv:

$$I_i = \frac{1}{2} \epsilon_0 c n_1 E_{oi}^2$$

$$I_r = \frac{1}{2} \epsilon_0 c n_2 E_{or}^2$$

$$I_t = \frac{1}{2} \epsilon_0 c n_1 E_{ot}^2$$

- výkon  $J$  je daný ako  $J = I \cdot A$ , kde  $A$  je plocha prierez vlny



$$A = \frac{A_i}{\cos \theta_i} = \frac{A_r}{\cos \theta_i} = \frac{A_t}{\cos \theta_t}$$

$$\Rightarrow J_i = \frac{1}{2} \epsilon_0 c n_1 E_{oi}^2 A \cos \theta_i$$

$$J_r = \frac{1}{2} \epsilon_0 c n_1 E_{or}^2 A \cos \theta_i$$

$$J_t = \frac{1}{2} \epsilon_0 c n_2 E_{ot}^2 A \cos \theta_t$$



$$\text{ZzE: } J_i = J_r + J_t \Rightarrow n_1 E_{oi}^2 \cos \theta_i = n_1 E_{or}^2 \cos \theta_i + n_2 E_{ot}^2 \cos \theta_t$$

- výkonové koeficienty:



$$R_{s,p} = \frac{J_r}{J_i} = \frac{E_{or}^2}{E_{oi}^2} = |r_{s,p}|^2$$

$$T_{s,p} = \frac{J_t}{J_i} = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |E_{s,p}|^2$$



## Opticky hustejšie prostredie





- ak  $\theta_i = \theta_{Br}$ , t.j.  $\theta_i = \frac{\pi}{n_1}$ , tak  $r_p = 0 \Rightarrow$  plne holmo polarizované
- $r_s < 0 \Rightarrow$  obracia polarizator



## Opticky ťedzie prostredie



- $r_s > 0 \Rightarrow$  neutrála polarizačov
- pre  $\theta \geq \theta_C$  nastáva totalný odraz s rôznymi fázovými posunmi  
 $\hookrightarrow$  do 2. prostredia prechádza evanescentná vlna, exp. elementár



# Interference 1

monochromatické vlny

- 2 sposoby - delení vlnoplošky
- delení amplitudy - beam splitter

## Dvojsazková interference rovinných vln

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{o_1} e^{i(\vec{k}_1 \cdot \vec{r} - \omega t + \delta_{o1})}$$

$$|\vec{k}_1| = |\vec{k}_2|$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$I = \frac{1}{4} \epsilon_0 n^2 \vec{E} \cdot \vec{E}^* = \frac{1}{4} \epsilon_0 n^2 (E_{o_1}^2 + E_{o_2}^2 + \vec{E}_{o_1} \cdot \vec{E}_{o_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} + \vec{E}_{o_1} \cdot \vec{E}_{o_2} e^{-i(\varphi_1 - \varphi_2)})$$

$$= I_1 + I_2 + \frac{1}{4} \epsilon_0 n^2 2 E_{o_1} E_{o_2} \cos \alpha \cos (\varphi_1 - \varphi_2) =$$

$$= I_1 + I_2 + \frac{1}{4} \epsilon_0 n^2 2 E_{o_1} E_{o_2} \cos \alpha \cos \delta_{12} (\vec{r})$$

$$I = I_1 + I_2 + 2 \sqrt{I_1 I_2} \cos \alpha \cos \delta_{12}$$

$$\delta_{12} = k (\vec{s}_{o_1} - \vec{s}_{o_2}) \cdot \vec{r} + \delta_{o1} - \delta_{o2}$$

pre  $\underline{\cos \alpha = 1}$ :

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2 \sqrt{I_1 I_2}$$

$$\delta_{12} = 0$$

viditelnost'


$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2 \sqrt{I_1 I_2}$$

$$\delta_{12} = \pi$$

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2 \sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$

$$\text{neh } I_1 = I_2 = I_0, \text{ potom } I = 2 I_0 (1 + \cos \delta_{12}) = 4 I_0 \cos^2 \frac{\delta_{12}}{2}$$

# Michelsonov interferometer ( $\vec{k}_1 \parallel \vec{k}_2$ )



$$\delta_{12} = \varphi_2 - \varphi_1 = k2(d_2 - d_1) = \frac{4\pi n}{\lambda}(d_2 - d_1)$$

→ maximum:  $\delta_{12} = 2m\pi :$

$$d_2 - d_1 = \frac{m\lambda}{2n}$$


→ minimum:  $\delta_{12} = \pi(2m+1)$

$$d_2 - d_1 = \frac{(m+\frac{1}{2})\lambda}{2n}$$

$$\left. \begin{array}{l} E_1 = t_{BS} r_{M_1} r_{BS} E_0 \\ E_2 = r_{BS} r_{M_2} t_{BS} E_0 \end{array} \right\} \text{ak budú zrhadla rovnate, tak } E_1 = E_2, \quad \text{teda } I_1 = I_2 = I_0.$$

$$\Rightarrow I = 4I_0 \cos^2\left(\frac{2\pi n}{\lambda}(d_2 - d_1)\right) \rightarrow \text{nezavisí na polohe}$$

- Zmenime chod strielaního paprsku:



$$\delta_{12} = k2(d_1 - d_2) \cos \theta = \frac{2\pi}{\lambda} 2n(d_1 - d_2) \cos \theta$$


- maxima:

$$(d_1 - d_2) \cos \theta = \frac{\lambda m}{2n}$$

- minima

$$(d_1 - d_2) \cos \theta = \frac{\lambda(m + \frac{1}{2})}{2n}$$

# Plan parallelní destička ( $\vec{k}_1 \parallel \vec{k}_2$ )



$$\sin \theta_i = \frac{|AD|}{x}$$

$$|ABC| = 2|AB| = \frac{x}{\sin \theta_e}$$

$$\text{tg} \theta_e = \frac{x/2}{d} \Rightarrow x = 2 \text{tg} \theta_e d$$


$$\begin{aligned}\delta &= \frac{2\pi}{\lambda} n_2 |ABC| - \frac{2\pi}{\lambda} n_1 |ADI| = \frac{2\pi}{\lambda} n_2 \frac{x}{\sin \theta_e} - \frac{2\pi}{\lambda} n_1 x \sin \theta_i = \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} n_2 \left( \frac{2 \text{tg} \theta_e d}{\sin \theta_e} - 2 \text{tg} \theta_e d \sin \theta_e \right) = \frac{2\pi}{\lambda} 2n_2 d \cos \theta_e\end{aligned}$$

$$\delta_0 = \frac{4\pi}{\lambda} n_2 d \cos \theta_e$$

$\rightarrow$  pre prípad • ak  $n_1 < n_2$  je nutné započítať fazový posun pri odraze:

$$\delta_0 = \frac{4\pi}{\lambda} n_2 d \cos \theta_e + \pi$$

# Nekolineárne vnorené vektory



$$|k_1| = |k_2| = k$$

$$\begin{aligned}\vec{k}_1 &= k (\sin \vartheta, 0, \cos \vartheta) = (k_x, 0, k_z) \\ \vec{k}_2 &= k (-\sin \vartheta, 0, \cos \vartheta) = (-k_x, 0, k_z)\end{aligned}$$

onechtí sú  $E_1, E_2$  v smere g

$$E_{g1} = E_0 e^{i(k_1 \cdot r - \omega t)} = E_0 e^{i(k_2 \cdot r - \omega t)} e^{i(k_1 \cdot x + \frac{\partial \phi}{2})}$$

$$E_{y2} = E_0 e^{c(k_z \cdot \vec{r} - \omega t)} = E_0 e^{c(k_z z - \omega t)} e^{-c(k_x x + \frac{\delta_0}{2})}$$

$$E_y = E_{y1} + E_{y2} = E_0 e^{c(k_z z - \omega t)} (e^{c(k_x x + \frac{\delta_0}{2})} + e^{-c(k_x x + \frac{\delta_0}{2})}) = E_0 e^{c(k_z z - \omega t)} 2 \cos(k_x x + \frac{\delta_0}{2})$$

$$I = \frac{1}{2} \epsilon_0 n^2 E_0^2 4 \cdot \cos^2(k_x x + \frac{\delta_0}{2}) = 4 I_0 (1 + \cos(2k_x x + \delta_0)) = 4 I_0 (1 + \cos(\frac{4\pi}{\lambda_0} \sin \vartheta x + \delta_0))$$


• maximum:

$$\frac{4\pi}{\lambda_0} \sin \vartheta x_{\max} + \delta_0 = 2m\pi$$

• minimum

$$\frac{4\pi}{\lambda_0} \sin \vartheta x_{\min} + \delta_0 = (2m+1)\pi$$

## Interferenční pravidlo



→ potom možeme použiť vzťah pre planparallelní destičky:

$$2nd \cos \theta_E = \lambda m \rightarrow \min \Rightarrow x_{\min} = \frac{\lambda m}{2nd} \cos \theta_E$$

$$2nd \cos \theta_E = \lambda(m + \frac{1}{2}) \rightarrow \max \Rightarrow x_{\max} = \frac{\lambda(m + \frac{1}{2})}{2nd} \cos \theta_E$$

# Interference mnohy vln

- stejné amplitudy

$$E_m = E_0 e^{i\varphi} e^{im\delta}$$

$$E_{tot} = E_0 e^{i\varphi} \sum_{m=1}^N e^{im\delta} = E_0 e^{i\varphi} \frac{1 - e^{iN\delta}}{1 - e^{i\delta}} =$$


$$|E_{tot}|^2 = E_0^2 \frac{1 - e^{iN\delta}}{1 - e^{i\delta}} \cdot \frac{1 - e^{-iN\delta}}{1 - e^{-i\delta}} = E_0^2 \frac{2 - 2\cos N\delta}{2 - 2\cos \delta} =$$

$$= E_0^2 \frac{1 - \cos N\delta}{1 - \cos \delta} = E_0^2 \frac{\sin^2(\frac{N\delta}{2})}{\sin^2(\frac{\delta}{2})}$$

$$\Rightarrow I = N^2 I_0 \frac{\sin^2(\frac{N\delta}{2})}{N^2 \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

$\delta$  je daný  
prejdeneou  
vzdialenosť

- rôzne amplitudy



$$E_{0,E} = t_{n_2} t_{21} e^{i\frac{\delta}{2}} E_i$$

$$E_{1,E} = t_{21} r_{21} r_{21} t_{12} e^{i\frac{\delta}{2}} e^{i\delta} E_i$$

$$E_{2,E} = t_{21} (r_{21} r_{21})^2 t_{12} e^{i\frac{\delta}{2}} e^{i2\delta} E_i$$

$$E_{l,E} = t_{21} r_{21}^{2l} t_{12} e^{i\frac{\delta}{2}} e^{il\delta} E_i$$

$$E_{tot} = \sum_{l=1}^{\infty} E_{l,E} = t_{21} t_{12} e^{i\frac{\delta}{2}} E_i \sum_{l=1}^{\infty} (r_{21} e^{i\delta})^l =$$

$$= t_{21} t_{12} e^{i\frac{\delta}{2}} E_i \frac{1}{1 - r_{21}^2 e^{i\delta}} \quad (1 - r^2)^2$$

$$r_{12} = -r_{21} = r$$

$$t_{21} t_{12} = (1+r_{21})(1+r_{21})$$

$$I = \frac{1}{4} \epsilon_0 n_1^2 E_{tot} E_{tot}^* = \frac{1}{4} \epsilon_0 n_1^2 E_0^2 (t_{21} t_{12})^2 \frac{1}{1 + r^4 - 2r^2 \cos \delta}$$

$$= I_0 \frac{(1 - r^2)^2}{(1 - r^2)^2 + 2r^2(1 - \cos \delta)} = I_0 \frac{1}{1 + \frac{2r^2}{(1 - r^2)^2}(1 - \cos \delta)} = I_0 \frac{1}{1 + \frac{4r^2}{(1 - r^2)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

$$= \frac{I_0}{1 + F \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

$$F = \frac{4r^2}{(1 - r^2)^2} = \frac{4R}{(1 - R)^2} \quad \dots \text{jemnosť}$$

# Interference 2

polychromaticke vlny

Dve vlny rôznej frekvencie

$$E_1 = E_0 \cos(k_1 z - \omega_1 t)$$

$$E_2 = E_0 \cos(k_2 z - \omega_2 t)$$

$$\begin{aligned} E = E_1 + E_2 &= E_0 \left( \cos(k_1 z - \omega_1 t) + \cos(k_2 z - \omega_2 t) \right) = \\ &= E_0 \cos\left(\frac{k_1 + k_2}{2} z - \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{k_1 - k_2}{2} z - \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \\ \bar{\omega} &= \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \quad \bar{k} = \frac{k_1 + k_2}{2} \\ \delta k &= \frac{k_1 - k_2}{2} = \frac{\Delta k}{2} \quad \delta \omega = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} = \frac{\Delta \omega}{2} \end{aligned}$$

$$E = E_0 \cos(\bar{k} z - \bar{\omega} t) \cos(\delta k z - \delta \omega t)$$

• pre  $\delta k \ll \bar{k}$ ,  $\delta \omega \ll \bar{\omega}$  je druhá časť modulačná

Grupová a fázova rýchlosť

$$V_g = \frac{\delta \omega}{\delta k} \rightarrow \frac{d\omega}{dk} |_{\bar{k}} \quad - \text{grupová rýchlosť}$$

$$V_f = \frac{\bar{\omega}}{\bar{k}} \quad - \text{fázova rýchlosť}$$


$$\bullet \text{ pre vakuum: } c = \frac{\omega_1}{k_1} = \frac{\omega_2}{k_2} \Rightarrow V_g = \frac{\omega_1 - \omega_2}{k_1 - k_2} = c \frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega_1 - \omega_2} = c = V_f$$

• disperzne prostredie


$$k(\omega) = \frac{\omega}{c} n(\omega)$$

$$V_g = \frac{d\omega}{dk} = \left( \frac{d\omega}{d\omega} \right)^{-1} = \left( \frac{n(\omega)}{c} + \frac{\omega n'(\omega)}{c} \right)^{-1} = \frac{\frac{c}{n(\omega)}}{1 + \omega \frac{n'(\omega)}{n(\omega)}}$$

$$V_g = \frac{V_f}{1 + \omega \frac{n'(\omega)}{n(\omega)}}$$



$V_f > V_g \rightarrow$  normalna disperzia




$V_f < V_g \rightarrow$  abnormálna dis.

# Difrakce

- najjednoduchší případ - skalárná approximace

## Difrakční integrál

$$E(x_0, y_0, z) = -\frac{i}{\lambda} \int_{\text{apertura}} E(X, Y, 0) \frac{e^{ikd}}{d} K(\nu) dX dY$$



$K(\nu)$  je uhlomží faktor, budeme předpokládat  $K(\nu) \approx 1$

## Fresnelova approximace

$$d = z \sqrt{1 + \frac{(x-X)^2 + (y-Y)^2}{z^2}} \approx z + \frac{(x-X)^2 + (y-Y)^2}{2z}$$

→ predpokladame velké vzdálenosti od apertury, teda  $(x-X)^2 + (y-Y)^2 \ll z^2$

$$E(x_0, y_0, z) = -\frac{i}{\lambda} \int E(X, Y, 0) \frac{e^{ikz}}{z} e^{ik \frac{(x-X)^2}{2z}} e^{ik \frac{(y-Y)^2}{2z}} dX dY$$

$$= -\frac{i}{\lambda} \frac{e^{ikz}}{z} e^{ik \frac{(x^2+y^2)}{2z}} \int E(X, Y, 0) e^{ik \frac{(x^2+y^2)}{2z}} e^{-ik \frac{(xX+yY)}{z}} dX dY$$

- malé otrvary
- velká vzdálenost

# Fravenhofova aproximace

- zanedbanie člena  $e^{ik\frac{(x^2+y^2)}{2z}}$ :

$$E(x, y, z) = -\frac{c}{\lambda} \frac{e^{ikz}}{z} e^{ik\frac{(x^2+y^2)}{2z}} \int E(x, r, 0) e^{-ik\frac{(xx+yy)}{z}} dx dr$$

platí pre  $e^{ik\frac{(x^2+y^2)}{2z}} \approx 1 \rightarrow 2z \gg k(x^2+y^2)$

- otvor approximujeme kruhom  $x^2+y^2 = (\frac{D}{2})^2$ ,  $D$  je max. rozmer otvoru:

$$z \gg z_{MEZ} \approx k \frac{D^2}{8}$$

## Intenzita na priamke kruhového otvoru

$$\begin{aligned} E(0, 0, z) &= -\frac{c}{\lambda} \int_{\text{kruh}} E_0 \frac{e^{ikr}}{r} dS = -\frac{c}{\lambda} E_0 \int \frac{e^{ik\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dz \\ &= \left| X = s \sin \varphi \quad Y = s \cos \varphi \right| = -\frac{c}{\lambda} E_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{D}{2}} \frac{e^{ik\sqrt{s^2+z^2}}}{\sqrt{s^2+z^2}} s ds d\varphi = \\ &= \left| \xi = \sqrt{s^2+z^2} \quad d\xi = \frac{s}{\sqrt{s^2+z^2}} ds \right| = -\frac{c}{\lambda} E_0 \int_0^{2\pi} \int_z^{\sqrt{\frac{D^2}{4}+z^2}} e^{iks} ds d\varphi = \\ &= -\frac{c}{\lambda} E_0 2\pi \left[ \frac{e^{ik\xi}}{ik} \right]_{z}^{\sqrt{\frac{D^2}{4}+z^2}} = E_0 \left( e^{ikz} - e^{ik\sqrt{\frac{D^2}{4}+z^2}} \right) \\ &\Rightarrow I \sim |E|^2 = 2E_0^2 \left( 1 - \cos \left( k \left[ z - \sqrt{\frac{D^2}{4}+z^2} \right] \right) \right) \end{aligned}$$

- Fravenhofova aproximace:

$$E(0, 0, z) = -\frac{c}{\lambda} \frac{e^{ikz}}{z} \int_{\text{kruh}} E_0 dx dr = -\frac{c}{\lambda} \frac{e^{ikz}}{z} E_0 \pi \frac{D^2}{4} \Rightarrow I = \frac{E_0^2 \pi^2 D^4}{16 \lambda^2 z^2}$$



# Babinetov princip

$$E_{\text{prekážka}} + E_{\text{otvor}} = E_{\text{bez prekážky}}$$


$$\begin{aligned} E_{\text{kruhová diera}} &= E_{\text{bez prekážky}} - E_{\text{otvor}} = E_0 e^{ikz} - E_0 (e^{ikz} - e^{ik\sqrt{\frac{D^2}{4} + z^2}}) \\ &= E_0 e^{ik\sqrt{\frac{D^2}{4} + z^2}} \end{aligned}$$

$$\rightarrow I(0,0,z) = |E_{\text{kruh. diera}}|^2 = E_0^2 \Rightarrow \text{Poissonova skúra}$$


## Difrakce na hrane (Fresnel)



## Difrakce na šírbone




Fresnelova app.



Frauenhoff. app.

## Difrakce na obdĺžniku (Frauenhoff)



$$E(x_1, y_1, z) = -\frac{c}{\lambda} \frac{e^{ikz}}{z} e^{\frac{ik(x_1^2 + y_1^2)}{2z}} E_0 \int_{\text{obdĺžnik}} e^{ik\frac{(xx_1 + yy_1)}{z}} dx dy$$


$$= -\frac{i}{\lambda} \frac{e^{ckz}}{z} e^{ck} \frac{(x^2+y^2)}{2z} E_0 \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{\frac{ckx}{z}} X dx \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} e^{\frac{cky}{z}} Y dy =$$

$$\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{\frac{ckx}{z}} X dx = \left[ \frac{e^{\frac{ckx}{z}} X}{i \frac{ck}{z}} \right]_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} = \frac{z}{ckx} 2c \sin \left( \frac{akx}{2z} \right) = a \frac{\sin m}{m}$$

$$\rightarrow \text{analogically, } a_j \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} e^{\frac{cky}{z}} Y dy = b \frac{\sin v}{v}$$

$$E = -\frac{i}{\lambda} \frac{e^{ckz}}{z} e^{ck} \frac{(x^2+y^2)}{2z} E_0 \left( b \frac{\sin v}{v} \right) \left( a \frac{\sin m}{m} \right)$$


$$I \sim E E^* = \left( \frac{E_0}{\lambda z} ab \right)^2 \frac{\sin^2 v}{v^2} \frac{\sin^2 m}{m^2}$$




- prve minimum 1) obdelníkový apertura  $v 1$   
2) kruhové apertura  $v 1,22$

## Rayleighovo kritérium

- kritérium pre schopnosť rozlíšenia dvoch bodov
- stanovi vhol, pod kt. sa dajú rozlísiť 2 body A, B
- A, B sa dajú rozlísiť, ak hľavne mák. A je schodné s prvým min. B



# Amplitúdová difrakční mřížka



- napišeme ako súčet vln, kde každá prechádzza jedným obdĺžnikom

$$E(X, Y, 0) = \sum_{n=1}^N E(X - X_n, Y - Y_n, 0)$$

$$E(X, Y, z) = -\frac{c}{\lambda} \frac{e^{ikz}}{z} e^{i\frac{k(x^2+y^2)}{2z}} \sum_{n=1}^N \int E(X - X_n, Y - Y_n, 0) e^{-ik\frac{xX-yY}{z}} dx dy$$

užobením substitúcie  $X' = X - X_n$ ,  $Y' = Y - Y_n$  možeme

$$E(X, Y, z) = -\frac{c}{\lambda} \frac{e^{ikz}}{z} e^{i\frac{k(x^2+y^2)}{2z}} \sum_{n=1}^N e^{-ik\left(\frac{(xX_n+yY_n)}{z}\right)} \int E(X', Y', 0) e^{-ik\frac{xX'-yY'}{z}} dx' dy'$$

$\rightarrow$  ďaleko možeme napišať ako

$$E = E_0 f_1 \sum_{n=1}^N e^{-ik\frac{xX_n+yY_n}{z}} - E_0 f_1 N F_N$$

$$X_n = \left(n - \frac{N+1}{2}\right) h \quad Y_n = 0$$

kde  $f_1$  je dane  
desperziov na obdelníku


$$\Rightarrow F_N = \frac{1}{N} e^{ik\frac{N+1}{2} \frac{hx}{z}} \sum e^{-ik\frac{nhx}{z}} = \frac{\sin(N\gamma)}{N \sin(\gamma)} \quad \gamma = \frac{hx}{2z}$$

$$\Rightarrow I(X, 0, z) \propto I_0 \left(\frac{\sin N\gamma}{N \sin \gamma}\right)^2 \left(\frac{\sin v}{v}\right)^2 \left(\frac{\sin u}{u}\right)^2$$

$$u = \frac{ah}{2} \sin \varphi \quad v = \frac{bh}{2} \sin \psi$$

$\varphi$  je uhol dopadu a  $\psi$  uhol pozorovania

# Mriežkova rovnica




$$\delta = k(\Delta l_2 - \Delta l_1) = \frac{2\pi}{\lambda} (d \sin \theta_2 - d \sin \theta_1)$$

- maxima:  $m\lambda = d(\sin \theta_2 - \sin \theta_i)$
- minima:  $(m + \frac{1}{2})\lambda = d(\sin \theta_2 - \sin \theta_i)$

• **uhlová disperzie**:  $D_\nu = \left. \frac{d\theta}{d\lambda} \right|_{\nu_i=\text{konst}} = \frac{m}{d \cos \theta}$

• **volný spektrálny interval** — interval vlnoučích dĺžok  $[\lambda_1, \lambda_2]$ , pre ktoré platí, že  $\theta_{\lambda_1}^{m+1} < \theta_{\lambda_2}^m$ , kde



$\Rightarrow$  teda  $m$ -te maximum  $\lambda_1$  nepresahne  $m+1$  maximum  $\lambda_2$


• pre medziľahlého plátr ( $\text{ted } \theta_{\lambda_1}^{m+1} = \theta_{\lambda_2}^m$ ):  
 $h(\sin \theta_{\lambda_{sm}} - \sin \theta_i) = m\lambda_2 = (m+1)\lambda_1$

$\rightarrow$  volný interval vlnoučích dĺžok:

$$\lambda_{sm} = \lambda_2 - \lambda_1 = \frac{\lambda}{m}$$

## Holografie

### Zápis



predmet

$$E_{REF} = A_{REF} e^{-i\omega t} e^{-ik_{ref} \sin \alpha}$$

$$E_{SIG} = A_{SIG}(x) e^{-i\omega t} e^{-ik_{sig} \sin \beta(x)}$$

$$I_F(k) = A_{ref}^2 + A_{sig}^2(x) + A_{sig} A_{ref} e^{-ck} e^{i\theta} + A_{sig} A_{ref} e^{ck} e^{-i\theta}$$


→ holografický film zaznamená činitele el. pole

→ pomocou ref. vlny zaznamenáme aj info o fázę signálnej vlny

### • Čtení

$$t(k) = t_0 - \alpha I_F(x) \rightarrow \text{amplitudová propustnosť}$$

↳ pre neslep. film



$$E_H(k) = t(k) E_{\text{ref}} = t_0 E_{\text{ref}} - \alpha [A_{\text{ref}}^2 + A_{\text{sig}}^2] E_{\text{ref}} \cdot A_{\text{ref}}^2 A_{\text{sig}} e^{-i(2k-\theta)} e^{-ikz} + A_{\text{ref}}^2 A_{\text{sig}} e^{-iQ} e^{-iuz}]$$

- vo výsledku bude dve vlny:

- 1) pravá zájímú ref. hologramem
- 2) ref. vlna, ale amplituda je uplynutá hologramem

- 3) vytvára realny obraz, ale kde pôvodne neboli

- 4) vytvára virtuálny obraz, kde pôvodne bol pôvodný

↳ pomocou šošavy - realny pôvodný

# Kohärenz

korelace záření

## Popis kohärence

- sledujeme vlastnosti el. pole vlnového balíku, na různých místech  $\vec{r}_1, \vec{r}_2$  a různých časech  $t_1, t_2 + \tau$
- statistické vlastnosti el. pola
- **kvazimonochromatické záření**:  $\omega \in (\bar{\omega} - \Delta\omega, \bar{\omega} + \Delta\omega)$   $\Delta\omega \ll \bar{\omega}$   
 ↳ popisuje funkce:  $\vec{E}(\vec{r}, t) = A(t) e^{i(\alpha(t) - \bar{\omega}t)}$

## korelační funkce - pro stat. případ:

$$\Gamma_{12}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau) = \langle \vec{E}_1(\vec{r}_1, t) \vec{E}_2^*(\vec{r}_2, t + \tau) \rangle_{\text{el.}} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \vec{E}_1(\vec{r}_1, t) \vec{E}_2^*(\vec{r}_2, t + \tau) dt$$


$$\begin{aligned} I_d(\vec{r}_3) &= \frac{1}{4} \epsilon_0 \epsilon_r \langle (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)(\vec{E}_1^* + \vec{E}_2^*) \rangle_{\text{el.}} = \\ &= \underbrace{\frac{1}{4} \epsilon_0 \epsilon_r \langle |\vec{E}_1|^2 \rangle_0}_{I_1(0)} + \underbrace{\frac{1}{4} \epsilon_0 \epsilon_r \langle |\vec{E}_2|^2 \rangle_0}_{I_2(0)} + \underbrace{\frac{1}{4} \epsilon_0 \epsilon_r \langle \vec{E}_1 \vec{E}_2^* + \vec{E}_2 \vec{E}_1^* \rangle_{\text{el.}}}_{2 \operatorname{Re}\{\Gamma_{12}(\tau)\}} \end{aligned}$$

$$I_d(\vec{r}_3) = I_1 + I_2 + \frac{1}{4} \epsilon_0 \epsilon_r 2 \operatorname{Re}\{\Gamma_{12}(\tau)\} = \\ = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \operatorname{Re}\{\gamma_{12}(\tau)\}$$

$$\gamma_{12}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau) = \frac{\Gamma_{12}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)}{\sqrt{\Gamma_1(0) \Gamma_2(0)}} \rightarrow \text{komplektní stupeň kohärence}$$

## Časová kohärence


- jedno místo, ale různé časy:  $\vec{r}_1 = \vec{r}_2 = \vec{r}_s$ ,  $t_1, t_2 + \tau$
- použijeme Michelsonova interferometru



$$\text{Lze kde } \tau = \frac{d_2 - d_1}{c} \text{ je časový posun}$$

$$\gamma(\tau) = \frac{\Gamma_{12}(\tau)}{\sqrt{\Gamma_1(0) \Gamma_2(0)}}$$

## • skokový model



→ náme jedná vlnu, kt. sa skokovo mení faza a posleme do IF aby sme dosiahli  
dve posunute o  $\tau = \frac{d_2 - d_1}{c}$

$$\begin{aligned} \Gamma(\tau) &= \langle E(\vec{r}, t+\tau) E^*(\vec{r}, t) \rangle_{E_0} = \langle E_0^2 e^{-i\omega_0 \tau} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} \rangle = \\ &= \frac{E_0^2 e^{-i\omega_0 \tau}}{Nt_0} \left( \int_0^{t_0-\tau} e^{i0} dt + \int_{t_0-\tau}^{t_0} e^{iH_1} + \int_{t_0}^{t_0+\tau} e^{i0} + \dots \right) = \\ &= \frac{E_0^2 e^{-i\omega_0 \tau}}{Nt_0} \left( N(t_0 - \tau) + \tau \underbrace{\sum_{n=1}^N e^{iH_n}}_{\text{Hn náhodne}} \right) \end{aligned}$$

Hn náhodne  $\Rightarrow e^{iH_n} = 0$

$$\Gamma(\tau) = E_0^2 e^{-i\omega_0 \tau} \left( 1 - \frac{\tau}{t_0} \right)$$

$$\gamma(\tau) = e^{-i\omega_0 \tau} \left( 1 - \frac{\tau}{t_0} \right)$$

$$I = 2I_0 \left( 1 + \cos(\omega_0 \tau) \left( 1 - \frac{\tau}{t_0} \right) \right)$$

$$I_{\max} = 2I_0 \left( 2 - \frac{\tau}{t_0} \right) \quad I_{\min} = 2I_0 \left( \frac{\tau}{t_0} \right)$$

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \left( 1 - \frac{\tau}{t_0} \right) = |\gamma(\tau)|$$

## Prostorová koherence

- popisuje korelaciu v jehom čase  $t$ , ale na rôznych miestach  $\vec{r}_1, \vec{r}_2$

- Youngov polos

- sledujeme poriadanie vlny v bodech

$X_1, X_2$  interferencie na Youngovej

↪ dane sú časovými rozdielmi:


$$\tau_s = \frac{s_2 - s_1}{c}, \quad \tau_0 = \frac{d_2 - d_1}{c}$$

$$S_1 = \sqrt{D^2 + (x_s - \frac{b}{2})^2} \approx D \left( 1 + \frac{x_s^2 - bx_s + b^2}{2D} \right)$$

$$S_2 = \sqrt{D^2 + (x_s + \frac{b}{2})^2} \approx D \left( 1 + \frac{x_s^2 + bx_s + b^2}{2D} \right)$$

$$S_2 - S_1 = \frac{bx_s}{D}$$

↪ analogický  $d_2 - d_1 = \frac{bx_p}{R}$




- jeden bod

$$I \propto E_0^2 (1 + \cos(k(d_2 - d_1))) = E_0^2 (1 + \cos(\omega \tau_D))$$

- dva body

$$V = \left| \cos\left(\frac{ka h}{2R}\right) \right|$$




- všechna bodových zdrojů

$$V = \frac{\sin\left(\frac{ka h}{2R}\right)}{\frac{ka h}{2R}} = \frac{\sin m}{m}$$

- kruhový zdroj - Michel. stelarne IF

$$V = \left| \frac{2 J_1(m)}{m} \right|$$



# Geometrická optika

## Eikonaľ

- predpokladame velkosti obyktov  $\gg \lambda$   
 $k^2 \cdot \vec{r} = k_0 n \vec{s}_0 \cdot \vec{r} = k_0 n$ , kde  $d = \vec{s}_0 \cdot \vec{r}$  je optická dĺžka
- popis v nehomogénnom prostredí  $\Rightarrow E = E(\vec{r})$ ,  $n = n(\vec{r})$   
 ↳ obecná el. vlna nebude čisto rovinná:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0(\vec{r}) e^{ik_0 \varphi(\vec{r})} e^{-i\omega t}$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}_0(\vec{r}) e^{ik_0 \varphi(\vec{r})} e^{-i\omega t} \quad \varphi(\vec{r}) \text{ je eikonal}$$

## Eikonaľové rovnice

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0 \quad \vec{D} = \epsilon(\vec{r}) \vec{E} \rightarrow$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot (\epsilon(\vec{r}) \vec{E}) = \epsilon(\vec{r}) \nabla \cdot \vec{E}_0 + i k_0 \epsilon(\vec{r}) \vec{E}_0 \cdot \nabla \varphi(\vec{r}) + \vec{E}_0 \cdot \nabla \epsilon(\vec{r}) = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \rightarrow \nabla \cdot \vec{B}_0(\vec{r}) + i k_0 \vec{B}_0 \cdot \nabla \varphi(\vec{r}) = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = \epsilon(\vec{r}) \nabla \times \vec{E}_0 + i k_0 \epsilon(\vec{r}) \nabla \varphi(\vec{r}) \times \vec{E}_0 = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial r} = i \omega \vec{B}_0$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B}_0 + i k_0 \frac{1}{\mu_0} \nabla \varphi(\vec{r}) \times \vec{B}_0 = - i \omega \epsilon(\vec{r}) \vec{E}_0$$

- predpokladame  $\lambda_0 \rightarrow 0$ , teda  $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} \rightarrow \infty$  a domingú členy
- $$\vec{E}_0 \cdot \nabla \varphi(\vec{r}) = 0$$
- $$\vec{B}_0 \cdot \nabla \varphi(\vec{r}) = 0$$

$$\vec{B}_0 = \frac{k_0}{\omega} \nabla \varphi(\vec{r}) \times \vec{E}_0$$

$$\vec{E}_0 = \frac{-k_0}{\omega \epsilon} \nabla \varphi(\vec{r}) \times \vec{B}_0$$

$$\vec{E}_0 = -\frac{k_0^2}{\omega^2 \epsilon \mu_0} \nabla \varphi \times \nabla \varphi \times \vec{E}_0 = -\frac{1}{n^2} (\nabla \varphi (\nabla \varphi \cdot \vec{E}_0)) - \vec{E}_0 (\nabla \varphi \cdot \nabla \varphi)$$

$$n^2 \vec{E}_0 = \vec{E}_0 (\nabla \varphi)^2 \Rightarrow (\nabla \varphi)^2 = n^2 \Rightarrow \nabla \varphi = n \vec{s}$$

eikonaľová rovnica

## Paprsková rovnice

- paprsek = parametrická kružnica, ktorou je  $\vec{s}_o(\vec{r})$  lečna  
↳ jej param. vyjadrenie  $\vec{r}(s)$ , kde  $s$  je param  
→ potom platí:  $\frac{d\vec{r}(s)}{ds} = \vec{s}_o(\vec{r})$

→ teda z eikonal. rov:  $\nabla \Psi = n(\vec{r}) \vec{s}_o = n(\vec{r}) \frac{d\vec{r}}{ds}$

→ zderivávame:

$$\frac{d}{ds} [n(\vec{r}(s)) \vec{s}_o(\vec{r}(s))] = \nabla n(\vec{r})$$

## Lagrangeov invariant

$$\nabla \Psi = n(\vec{r}) \cdot \vec{s}_o(\vec{r}) \rightarrow \nabla \times \nabla \Psi = 0 = \nabla \times (\vec{n}(\vec{r}) \cdot \vec{s}_o(\vec{r}))$$

$$\Rightarrow 0 = \int \nabla \times (\vec{n}(\vec{r}) \cdot \vec{s}_o(\vec{r})) \cdot d\vec{S} = \oint_L n(\vec{r}) \vec{s}_o(\vec{r}) \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_L n(\vec{r}) \vec{s}_o(\vec{r}) \cdot d\vec{l} = 0 \rightarrow \text{Lag. invariant}$$


## Fermatov princip

Svetlo sa mezi dve dve bodmi širi po najkratšej optickej dráhe.

$$T = \int_A^B dt = \int_A^B \frac{ds}{v(\vec{r})} = \int_A^B \frac{n(\vec{r})}{c} ds$$

$$\hookrightarrow čas musí byť najkratší: \delta T = \delta \int_A^B n(\vec{r}) ds = 0$$

# Descartovy placky




## Paraxiálna optika

- predpokladame:


- 1) platnosť paprskovej rôznicie
- 2) zákon odrazu a lomu
- 3) paprsek nezávisí na iných paprskoch
- 4) paprsek nezávisí na volbe ťípky:
- 5) kolineárne transformácie opt. prístrojov




## Dioptrická sústava



## Katoprická sústava



# Gaussova zobrazenacia rovinka



**Kardinalné body:**

H, H' ... hlavné body


F, F' ... ohniskove body

U, U' ... uzlové body (uhlové zväčšenie konjugovaných priamok  $\neq 1$ )


$$\frac{f}{a} + \frac{f'}{a'} = 1$$

$$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} = \frac{f}{f-a} = \frac{f'-a'}{f'}$$

## Maticová optika



### • Sírenie medzi rovinami



$$\begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}$$


poenosom  
matica dana OS

$$\theta_1 = \theta_2$$

$$y_2 = y_1 - \lg \theta_1 d \approx y_1 - \theta_1 d$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}$$

• lom na kruhové ploše



$$n_1 \phi_i = n_2 \phi_e$$

$$\sin \vartheta = \frac{y_1}{R} \approx \vartheta$$

$$\vartheta = \theta_1 + \phi_i$$

$$\frac{y_1}{R} = \theta_1 + \phi_i$$

$$\Rightarrow \frac{y_1}{R} = \theta_2 + \frac{n_1}{n_2} \left( \frac{y_1}{R} - \theta_1 \right)$$

$$\vartheta = \theta_2 + \phi_e$$

$$\frac{y_1}{R} = \theta_2 + \frac{n_1}{n_2} \phi_i$$

$$\Rightarrow \theta_2 = \left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right) \frac{y_1}{R} + \frac{n_1}{n_2} \theta_1 \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right) \frac{y_1}{R} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}$$

↪ spec. případ:  $\theta_1 = 0$ ,  $\theta_2 = \frac{y}{f'}$

$$\Rightarrow \frac{1}{f'} = \left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right) \frac{1}{R} \Rightarrow T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{f'} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}$$

• gaussova zob. rovnice

$$T = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -a' \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{přenos 1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{f'} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}}_{\text{lom}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{přenos 2}} = \begin{pmatrix} 1 & -a' \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -a \\ \frac{1}{f'} & -\frac{a}{f'} + \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{f'} & -a + \frac{aa'}{f'} - a' \frac{n_1}{n_2} \\ \frac{1}{f'} & -\frac{a}{f} + \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}$$

→ podmínka je aby se paprsky setkali  $\Rightarrow y_2$  nesmí záviset na  $\theta_1$

$$\Rightarrow -a + \frac{aa'}{f'} - a' \frac{n_1}{n_2} = 0 \rightarrow a = a' \left( \frac{q}{f'} - \frac{n_1}{n_2} \right) = a' \left( \frac{q}{f'} - \frac{f}{f'} \right)$$

$$\Rightarrow af' = a'(a-f) \Rightarrow \frac{a-f}{a} = \frac{f'}{a'} \rightarrow 1 - \frac{f}{a} = \frac{f'}{a'} \Rightarrow 1 = \frac{f}{a} + \frac{f'}{a'}$$

### • fénkohmický

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{f'_1} & \frac{n_2}{n_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{f'_2} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2} \frac{n_2}{n_3} & \frac{n_1}{n_3} \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{f'_1} = \left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right) \frac{1}{R_1}$$

$$\frac{1}{f'_2} = \left(1 - \frac{n_2}{n_3}\right) \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2} \frac{n_2}{n_3}$$

pro  $n_1 = n_3 = 1$ ,  $n_2 = n$ :

$$\frac{1}{f'} = (1-n) \frac{1}{R_2} + (n-1) \frac{1}{R_1} = \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)(n-1) = -\frac{1}{f}$$

### • odraz na zrcadle

$$\frac{f}{a} + \frac{f'}{a'} = 1 \Rightarrow f = f' = \frac{R}{2} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{2}{R}$$

## Zrácenie



• prečne  $M_T = \frac{y'}{y} = A = \frac{f'-a'}{f'} = \frac{f}{f-a}$

• pozdižne  $M_L = \frac{\Delta a'}{\Delta a}$

• ohľadné  $M_\theta = \frac{\Theta y'}{\Theta y} \approx \frac{\Theta'}{\Theta} = D$


## Optické prístroje

### Oko



→ pojem opt. prístrojov = zrácenie v


## Lupa



$$f' - a' = -(l + \sigma) \quad \frac{y'}{y} = \frac{f' - a'}{f'} = - \frac{l + \sigma}{f'}$$

$$\begin{aligned} v_L &= -\frac{y}{L} & M_{MG} &= \frac{v_{MG}}{v_L} = \frac{-\frac{y'}{L}}{-\frac{y}{L}} = \frac{y'}{y} \frac{L}{l} = -\frac{l + \sigma}{f'} \frac{L}{l} = \frac{L}{f} \left(1 + \frac{\sigma}{L}\right) \\ v_{MG} &= -\frac{y'}{l} & \text{Erklärung: } & \end{aligned}$$


## Mikroskop



$$v_L = -\frac{y}{L} \quad v'^{-1} = \frac{y'}{f_2} \quad M = \frac{\frac{y'}{f_2}}{-\frac{y}{L}} = -\frac{y'}{y} \frac{L}{f_2} = -\frac{\Delta}{f'_1} \frac{L}{f'_2}$$


$$\frac{y'}{y} = -\frac{\Delta}{f'_1}$$

## Dalekohlínad




## Kepler

$$M = \frac{v_1'}{v_2'} = \frac{\frac{y}{f_1'}}{\frac{y_1'}{f_2}} = \frac{f_1'}{f_2}$$



## Fotoaparát



# Anizotropné prostredie

## Základný popis

$$\vec{P} = \epsilon_0 \overset{\leftrightarrow}{\chi} \vec{E} = \epsilon_0 (1 - \overset{\leftrightarrow}{\epsilon}_r) \vec{E}$$

$$\overset{\leftrightarrow}{\epsilon}_r = \begin{pmatrix} n_1^2 & & \\ & n_2^2 & \\ & & n_3^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} \text{predpokladame} \\ \text{diagonálizovanú matice} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} D_x = \epsilon_0 n_1^2 E_x = \epsilon_0 n_1^2 E_{0x} e^{i(k \cdot r - \omega t)} \\ D_y = \epsilon_0 n_2^2 E_y = \epsilon_0 n_2^2 E_{0y} e^{i(k \cdot r - \omega t)} \\ D_z = \epsilon_0 n_3^2 E_z = \epsilon_0 n_3^2 E_{0z} e^{i(k \cdot r - \omega t)} \end{array} \right\} \text{vidime, že obecne } \vec{D} \parallel \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = c \vec{k} \cdot \vec{D} = 0 \Rightarrow \vec{k} \perp \vec{D}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = c \vec{k} \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = 0$$

$$\Rightarrow \text{obecne } \vec{k} \cdot \vec{E} \neq 0 \Rightarrow \vec{k} \text{ nemôže kolme na } \vec{E}$$

## Fresnelova rovnica

$$\vec{k} \times \vec{H} = -\omega \vec{D} = -\omega \epsilon_0 \overset{\leftrightarrow}{\epsilon}_r \vec{E}$$

$$\vec{k} \times \vec{E} = \omega \vec{B} = \omega \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{k} \times \vec{k} \times \vec{E} = -\omega^2 \overset{\leftrightarrow}{\epsilon}_r \vec{E}$$

$$\vec{k}(\vec{k} \cdot \vec{E}) - k^2 \vec{E} = -\omega^2 \overset{\leftrightarrow}{\epsilon}_r \vec{E}$$

$$k^2 \vec{s}_0 (\vec{s}_0 \cdot \vec{E}) - k^2 = -\omega^2 \overset{\leftrightarrow}{\epsilon}_r \vec{E} \Rightarrow n^2 \vec{s}_0 (\vec{s}_0 \cdot \vec{E}) - n^2 \vec{E} = -\overset{\leftrightarrow}{\epsilon}_r \vec{E}$$

$$\Rightarrow (n^2 - n_1^2) E_x = n^2 s_{0x} (\vec{s}_0 \cdot \vec{E}) \quad (*)$$

$$(n^2 - n_2^2) E_y = n^2 s_{0y} (\vec{s}_0 \cdot \vec{E})$$

$$(n^2 - n_3^2) E_z = n^2 s_{0z} (\vec{s}_0 \cdot \vec{E})$$

$$\Rightarrow \frac{S_{ox}^2}{n^2 - n_1^2} + \frac{S_{oy}^2}{n^2 - n_2^2} + \frac{S_{oz}^2}{n^2 - n_3^2} = \frac{1}{n^2} \quad \rightarrow \text{Fresnelova rovnica}$$

↳ alternating zápis:

$$(n^2 - n_3^2)(n^2 - n_2^2)n^2 S_{ox}^2 + (n^2 - n_2^2)(n^2 - n_1^2)n^2 S_{oy}^2 + (n^2 - n_1^2)(n^2 - n_2^2)n^2 S_{oz}^2 = \\ = (n^2 - n_1^2)(n^2 - n_2^2)(n^2 - n_3^2)$$

- $n$  je neznáma, určí rýchlosť strenci

↳ obecne môže mať viacero riešení



- pre  $n_1 = n_2 \rightarrow$  jednooseť materiál, osa  $z$  je optická osa  
↳ z rovnice dostaneme:

$$(n - n_1^2) \left[ -(n^2 - n_1^2)(n^2 - n_3^2) + n^2 ((n^2 - n_2^2)S_{ox}^2 + (n^2 - n_3^2)S_{oy}^2 + (n - n_1^2)S_{oz}^2) \right] = 0$$

→ prve riešenie je  $n_o^2 = n_1^2 \rightarrow$  fyz. ordinárna vlna  
→ nezávisí na  $\vec{s}_o$


→ druhé riešenie je extra ordinárna vlna ne, v reze  $y=0$   
dostaneme:

$$\frac{1}{n_e^2} = \frac{\sin^2 \vartheta}{n_3^2} + \frac{\cos^2 \vartheta}{n_1^2} \rightarrow 1 = \frac{x^2}{n_3^2} + \frac{z^2}{n_1^2} \xrightarrow{3D} 1 = \frac{x^2}{n_3^2} + \frac{y^2}{n_1^2} + \frac{z^2}{n_1^2}$$




- 1) pre  $n = n_1 = n_o \Rightarrow (*)$  dostaneme, že  $E_z = 0, E_x = 0$ , lin. pol.
- 2) pre  $n = n_3 = n_e$  - vlna je lin. polarizovaná

# Poyntingov vektor



- $\vec{S}$  je tecne' na normale k placi
  - $\vec{S} \perp \vec{E}_0$  (z def.)
- $\downarrow$  normala
- $$\vec{N} = \left( \frac{2n_e \sin \vartheta}{n_s^2}, 0, \frac{2n_e \cos \vartheta}{n_s^2} \right)$$


## Lom svetla




- pridna vlna:  $n_i \sin \Theta_i = n_o \sin \Theta_{eo}$
- mnozradna vlna:  $n_i \sin \Theta_i = n_e(\Theta_{eo}) \sin \Theta_{eo}$

## Pozitie



### Roscheou polohanol



### Fázová destička



### Kompenzátor



→ rozdelenie vln na 2 polariz.

- posun faze:  
 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d(n_e - n_o)$

- obecny nastaviteľny posun fize  
 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o)(t_2 - t_1)$


## Indikatrix

- alternatívny popis, keďže  $n = n(\vec{D})$  a nie  $n = n(\vec{s}_0)$

$$We = \frac{1}{2} E \cdot D = \frac{1}{2} (E_x D_x + E_y D_y + E_z D_z) = \frac{1}{2} \left( \frac{D_x^2}{\varepsilon_1} + \frac{D_y^2}{\varepsilon_2} + \frac{D_z^2}{\varepsilon_3} \right)$$


$$\Rightarrow \frac{D_x^2}{n_1^2} + \frac{D_y^2}{n_2^2} + \frac{D_z^2}{n_3^2} = 1 \quad \text{, kde súme normalizované } 2We \varepsilon_0 = 1$$

→ jeden elipsoid dľa info o ord. aj ext. ord. value



# Vláknová optika

## Vedenie vlny



→ Totalny odraz

- medzerný uhol:
- $$n_1 \sin \alpha_c = n_2 \rightarrow \sin \alpha_c = \frac{n_2}{n_1}$$
- $$n_0 \sin \theta_i = n_1 \sin \theta_r = n_1 \cos \alpha_c$$

$$\Rightarrow \left( \frac{n_0}{n_1} \right)^2 \sin^2 \theta_i = \cos^2 \alpha_c \\ \left( \frac{n_2}{n_1} \right)^2 = \sin^2 \alpha_c \quad \left. \right] \Rightarrow 1 = \frac{n_0^2}{n_1^2} \sin^2 \theta_i + \frac{n_2^2}{n_1^2}$$

$$\Rightarrow \left( 1 - \frac{n_2^2}{n_1^2} \right) \frac{n_1^2}{n_0^2} = \sin^2 \theta_i \Rightarrow n_0^2 \sin^2 \theta_i = n_1^2 - n_2^2$$

$$\Rightarrow \sin \theta_i = \frac{NA}{n_0} \quad NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

## Módy

$$\Delta \varphi = k 2d \cos \alpha + \Delta \varphi_{odr} \approx 2n_k d \cos \alpha = 2m\pi$$

$$\left[ \frac{2d}{\lambda_0} n_k \cos \alpha_c \right] = \left[ \frac{2d}{\lambda_0} NA \right] = M$$

- $M+1$  udava počet módov, kt. sa môže sifit' vlna

## Útlum

$$B = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$$

→ výkon na vstupi  
→ útlum  
↳ výkon na výstupi

# Nelineárna optika

- roznej vzťahu  $P_i = \epsilon_0 X_{ij}(\omega_j) E_j(\omega_j)$

$$P_i = \epsilon_0 X_{ij}(\omega_j) E_j(\omega_j) + \epsilon_0 X_{ijkl}(\omega_i, \omega_j, \omega_k) E_j(\omega_j) E_k(\omega_k) +$$

2. rádu

$$+ \epsilon_0 X_{ijkl}(\omega_i, \omega_j, \omega_k, \omega_l) E_j(\omega_j) E_k(\omega_k) E_l(\omega_l)$$

3. rádu

## 2. rádu

$$P_i^{(2)} = \epsilon_0 X_{ijk} E_j E_k$$

- pre  $E = E_0 \left( \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} \right) = E_0 \cos \omega t$  a izotropné prostredie:

$$P_i^{(2)} = \epsilon_0 \frac{E_0^2}{4} \left( e^{2i\omega t} + e^{-2i\omega t} + 1 \right) = \underbrace{\epsilon_0 \frac{E_0^2}{4}}_{\text{optické usmernenie}} + \underbrace{\epsilon_0 \frac{E_0^2}{2} \cos(2\omega t)}_{\text{vlna 2. rádu}}$$

- generovanie druhej harmonickej
- konštantná polarizácia

- podmienka stávorania:  $2k_1 = k_2 \rightarrow 2\omega \frac{n(\omega)}{c} = 2\omega \frac{n(2\omega)}{c}$   
 $\Rightarrow n(\omega) = n(2\omega)$

## 3. rádu

$$P_i^{(3)} = \epsilon_0 \frac{E_0^3}{8} \left( e^{-i3\omega t} + e^{i3\omega t} \right)^3 = \epsilon_0 \frac{E_0^3}{8} \left( e^{-i3\omega t} + e^{i3\omega t} + 3e^{i\omega t} + 3e^{-i\omega t} \right)$$

$$= \underbrace{\epsilon_0 \frac{E_0^3}{4} \cos(3\omega t)}_{P_{3\omega}} + \underbrace{\frac{3}{4} \epsilon_0 E_0^3 \cos(\omega t)}_{P_{\omega}}$$

  $E_{\text{retia harmonicka'}}$

 intenzita

$$P_{\omega}^{(3)} = \epsilon_0 \frac{3}{4} E_o^2 (E_o \cos(\omega t)) \propto I E(t)$$

$$P_{\omega} = P_{\omega}^{(1)} + P_{\omega}^{(3)} = \epsilon_0 X_L E(t) + \epsilon_0 X_{NL} E(t)$$

$$\Rightarrow n = n_L + n_{NL} = n_L + \frac{1}{2} n_2 I \quad ; n_2 = \frac{3 \chi^{(3)}}{2 n_L^2 \epsilon_0 c}$$

$\Rightarrow$  samofokusace a automodulace

# Interakce záření s hmotou

## Základní popis

$$I = I_0 e^{-\alpha z}, \quad \alpha - \text{extinkční koef.}$$

$\hookrightarrow$  pri absorpcí = absorpcní koeficient

$$E_x = E_0 e^{-k_F z} e^{i(k_R z - \omega t)} = E_0 e^{i(\tilde{k} z - \omega t)}$$

$$\tilde{k} = k_R + i k_I \rightarrow \text{cplk. dlnouj vektor}$$

$$\left. \begin{array}{l} k_R = \frac{\omega}{c} n \\ k_I = \frac{\omega}{c} \chi_R \end{array} \right\} \tilde{N} = n + i \chi_R \rightarrow \text{cplk. index lomu}$$

$$\nabla_x E = - \frac{\partial}{\partial \epsilon} \vec{B} \rightarrow \frac{\partial E_x}{\partial z} = - \frac{\partial}{\partial \epsilon} B_y$$

$$\rightarrow B_y = E_0 \frac{\tilde{k}}{\omega} e^{i(\tilde{k} z - \omega t)} = \frac{E_0}{\omega} |\tilde{k}| e^{i\varphi_R} e^{i(\tilde{k} z - \omega t)} = B_0 e^{\underbrace{i\varphi_R}_{\text{fázový posun}}} e^{i(\tilde{k} z - \omega t)}$$

$$\Rightarrow \vec{B}_0 \vec{E} \text{ nehnitají vo fázi} \quad \operatorname{tg} \varphi_R = \frac{\tilde{k}}{\omega}$$

$$H_y = \epsilon_0 c |\tilde{N}| e^{i\varphi_R} E_x \quad \epsilon_r = \tilde{N}^2$$

$$D_x = \epsilon_0 |\tilde{N}|^2 e^{i2\varphi_R} E_x$$

$\hookrightarrow$  posun o  $2\varphi_R$

$$P_x = \epsilon_0 |\tilde{X}| e^{i\varphi_X} E_x \quad \tilde{X} = X_R + i X_I$$

$$\epsilon_R = X_R + 1$$

$$\epsilon_I = X_I$$

# Fresnelovy koeficienty

$$\Theta_i = \Theta_t = 0 \Rightarrow r_{sp} = r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

$$\text{pro } n_1 = 1 \Rightarrow r = \frac{1 - n_2}{1 + n_2} \Rightarrow r = \frac{1 - n_2 - iK_2}{1 + n_2 + iK_2}$$

neabsorbiční

$$R = |r|^2 = \frac{1 - n_2 - iK_2}{1 + n_2 + iK_2} \cdot \frac{1 - n_2 + iK_2}{1 + n_2 - iK_2} = \frac{(1 - n_2)^2 - K_2^2}{(1 + n_2)^2 + K_2^2} = R$$

absorbiční

# Poyntingov vektor

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \operatorname{Re}\{\vec{E}\} \times \operatorname{Re}\{\vec{H}\} = \frac{1}{2} (E_x + E_x^*) \frac{1}{2} (H_y + H_y^*)$$

$$\langle S_z \rangle_T = \frac{1}{4} \left\langle E_x H_y + E_x^* H_y + E_x H_y^* + H_y^* E_x^* \right\rangle_T =$$

$\int_0^T \cos(2\omega t) = 0$   
 v integraci vymone

$$= \frac{1}{4} \left\langle E_x^* H_y + E_x H_y^* \right\rangle = \frac{1}{4} E_0^2 \epsilon_0 C \left\langle e^{i(kz - \omega t)} (n - iK) e^{-i(kz - \omega t)} + e^{-i(kz - \omega t)} (n + iK) e^{i(kz - \omega t)} \right\rangle =$$

$$= \frac{1}{4} E_0^2 \epsilon_0 C e^{-2k_I z} [n - iK + n + iK] = \underbrace{\frac{1}{2} E_0^2 \epsilon_0 C n}_I e^{-2k_I z} = I_0 e^{-2k_I z} = I_0 e^{-\alpha z}$$

$$\Rightarrow \alpha = 2k_I$$

# Lorentzov model

- model dielektrikum
- elektron = LHO

$$\ddot{x}(t) + \gamma \dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = \frac{q}{m} E(t) = \frac{q}{m} E_0 e^{-c\omega t}$$

$$\omega_0^2 = \frac{k_H}{m}$$

$$x(t) = x_0 e^{-c\omega t} :$$

$$-\omega^2 x_0 - c\omega \gamma x_0 + \omega_0^2 x_0 = \frac{q}{m} E_0$$

$$\Rightarrow x_0 = \frac{\frac{q}{m} E_0}{\omega_0^2 - c\omega \gamma - \omega^2}$$



$$P = q N x = \frac{q^2 N}{m} \frac{E_0 e^{-c\omega t}}{\omega_0^2 - c\omega \gamma - \omega^2} = \epsilon_0 X E$$

$$\Delta X = \frac{\frac{q^2 N}{\epsilon_0 m}}{\omega_0^2 - c\omega \gamma - \omega^2} = \frac{N q^2}{\epsilon_0 m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2} + i \frac{N q^2}{\epsilon_0 m} \frac{\gamma \omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma \omega)^2}$$


$\Delta X_R$        $\Delta X_I$

- 1 oscilátor bez frekv.,  $\gamma = 0$ :

$$\Delta X_R = \frac{q^2}{\epsilon_0 m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2}$$



I, III ... oblast normální disperze  
II ... oblast anormální disperze



## Drudeho model

\* vôlej nosce  $\Rightarrow k_H = 0 \Rightarrow \omega_0 = 0$



$$\tilde{\epsilon}_r = 1 + \frac{Nq^2}{\epsilon_{0m}} \cdot \frac{1}{c\gamma\omega - \omega^2} = 1 - \frac{c\omega_p^2}{c\gamma\omega + \omega^2}$$

$$\omega_p^2 = \frac{Nq}{\epsilon_{0m}}$$


plazmová frekv.

$$\tilde{\epsilon}_r = 1 - \frac{c\omega_p^2 \omega^2}{\omega^4 + \gamma^2 \omega^2} + c \frac{\gamma \omega_p^2}{\omega^4 + \gamma^2 \omega^2}$$

$\underbrace{\quad}_{Re}$        $\underbrace{\quad}_{Im}$



→ pre  $\omega > \omega_p$  hor neodráža čiarenie  $\Rightarrow$  presvitenie kon.



# Žárení černého tělesa

## Žárení černého tělesa

$$I_o(\nu, T) = I_r(\nu, T) + I_a(\nu, T)$$


$$1 = \frac{I_r}{I_o} + \frac{I_a}{I_o} = \varrho + \alpha$$

$$\varepsilon = \frac{I_e}{I_o} \rightarrow \text{emisivita} \quad \frac{\varepsilon}{\alpha} = \text{kons.} \rightarrow \text{nezávisí na materiálu}$$

→ Černé těleso vše absorbuje,  $\alpha_{BB} = 1$

$$\frac{\varepsilon}{\alpha} = \varepsilon_{BB}$$

$u_\nu(\nu, T)$  ... objemová hustota energie žárení na 1 Hz



$$B_\nu(\nu, T, \vartheta) = \frac{c}{4\pi} u_\nu(\nu, T) f(\nu) \cos \vartheta$$

## Wienov zákon

$$u_\nu(\nu, T) = A \nu^3 e^{-\frac{B\nu}{T}}$$

→ platí i bu pro velké  $\nu$   
⇒ LF katalyza

# Rayleighjeans - Jeansov zákon

$$M_\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$$

→ platí len pre malej ν  
⇒ UV katastrofa

## Planckov zákon

$$M_\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{b'\nu}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

→ platí pre všetky ν  
→ empiricky konst.  $a'$ ,  $b'$

↓ použitím uplynneho modelu

$$M_\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{E}{e^{\frac{E}{k_B T}} - 1} \Rightarrow E = b'\nu = h\nu$$
$$\frac{a'\nu}{T} = \frac{E}{k_B T} \rightarrow a' = \frac{h}{k_B}$$

⇒ uplynne spravny vzťah:

$$M_\nu(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

$$\hookrightarrow (R-J) \Rightarrow \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot \frac{\frac{h\nu}{k_B T}}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \cdot k_B T \approx \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$$

$$\hookrightarrow (W) \Rightarrow \frac{8\pi h}{c^3} \nu^3 \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \approx A \nu^3 e^{-\frac{h\nu}{T}}$$

