

Klasická elektrodynamika

Písenná část zkoušky

22. 5. 2007

1. Siločáry dipólu.

Nalezněte a vyřešte rovnici siločáry elektrického pole dipólu $\vec{p} = p \vec{e}_z$

$$\vec{E} = -\text{grad} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3 \vec{p} \cdot \vec{r} \vec{r} - \vec{p} r^2}{r^5}$$

Při řešení se doporučuje pracovat ve sférických souřadnicích, kde

$$d\vec{l} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\phi \vec{e}_\phi$$

a

$$\text{grad} f = f_{,r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} f_{,\theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} f_{,\phi} \vec{e}_\phi .$$

Řešení. Elektrické pole dipólu je

$$\vec{E} = -\nabla \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta) .$$

Použitím rovnice siločáry $\frac{d\vec{l}}{du} = \lambda \vec{E}$ dostáváme

$$dr = \lambda \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} 2 \cos \theta ,$$

$$r d\theta = \lambda \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} \sin \theta ,$$

$$r \sin \theta d\phi = 0 .$$

Poslední rovnice říká, že siločáry budou rovinné křivky ležící v rovině $\phi = \text{konst}$. Podělením prvních dvou dostáváme

$$\frac{dr}{r} = 2 \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta ,$$

tedy (pokud integrační konstantu označíme $-\ln r_0$)

$$\ln \frac{r}{r_0} = \ln \sin^2 \theta ,$$

a tedy rovnice siločáry je

$$r(\theta) = r_0 \sin^2 \theta .$$

2. Asynchronní motor v klidu.

V rámci kvazistacionárního přiblížení nalezněte moment síly, jaká působí na velmi dlouhý válec s osou totožnou s osou z , pokud je válec vložen do otáčivého magnetického pole

$$\vec{B} = B_0 (\cos \omega t \vec{e}_x + \sin \omega t \vec{e}_y) ,$$

kteří budí soustava cívek statoru. O válci poloměru a a výšce h předpokládejte, že vodivý je jen jeho plášť a ten je natolik tenký, že můžete uvažovat plošné proudy dané Ohmovým zákonem $\vec{j}_2 = \gamma_2 \vec{E}$. Předpokládejte dále, že plášť válce je vyrobený z málo vodivého materiálu. Proudů tekoucí na povrchu válce jsou potom natolik malé, že jimi buzené magnetické pole lze zanedbat (to platí jen u zkoušky, v praxi by šlo o stroj s malou účinností).

1) Zjistěte jaké elektrické pole doprovází v kvazistacionárním přiblížení proměnné pole magnetické. Využijte toho, že magnetické pole nezávisí na prostorových souřadnicích a tedy elektrické pole lze hledat mezi lineárními funkcemi souřadnic. Vybte takové pole, které respektuje translační symetrii podél osy z . Pro velmi dlouhý válec je navíc rozumné požadovat aby, siločáry byly rovnoběžné s osou z .

2) Spočítejte proudy tekoucí po válcové ploše v přiblížení $a \ll h$.

3) Spočítejte moment sil těchto proudů.

Při integraci po povrchu válce můžete využít $\int x^2 dS = \int y^2 dS = Sa^2/2$, kde $S = 2\pi ah$ je plocha pláště válce a $\int xz dS = \int yz dS = \int xy dS = 0$.

Řešení. 1) Elektrické pole má i) mít siločáry rovnoběžné s osou z , ii) neměnit se při posunutí v tomto směru a iii) má to být lineární funkce souřadnic. Takové pole lze zapsat

$$\vec{E} = (px + qy) \vec{e}_z .$$

Rovnice $\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$ má tedy tvar

$$\nabla(px + qy) \times \vec{e}_z = q\vec{e}_x - p\vec{e}_y = \omega B_0 \sin \omega t \vec{e}_x - \omega B_0 \cos \omega t \vec{e}_y .$$

Odsud snadno odečteme hodnoty p a q a získáme tvar elektrického pole respektujícího symetrii problému

$$\vec{E} = \omega B_0 (x \cos \omega t + y \sin \omega t) \vec{e}_z .$$

2) Po povrchu válce protéká proud

$$\vec{j}_2 = \vec{j}_2 \vec{E} = \gamma_2 \omega B_0 (x \cos \omega t + y \sin \omega t) \vec{e}_z .$$

V souladu se zadáním předpokládáme, že magnetické pole jím vyvolané je velmi slabé a můžeme jej zanedbat oproti budícímu poli B_0 . Stále předpokládáme, že $a \ll h$. U konců válce přestávají být proudočáry rovnoběžné s osou z , neboť se musejí uzavírat do smyček. Dle předpokladu je ale tato oblast velmi malá ve srovnání s délkou válce.

3) Moment síly spočteme jako integrál

$$\vec{\mathcal{M}} = \int \vec{r} \times (\vec{j}_2 \times \vec{B}) dS .$$

Nejprve tedy spočteme

$$\begin{aligned} \vec{j}_2 \times \vec{B} &= \gamma_2 \omega B_0 (x \cos \omega t + y \sin \omega t) \vec{e}_z \times B_0 (\cos \omega t \vec{e}_x + \sin \omega t \vec{e}_y) = \\ &= \gamma_2 \omega B_0^2 (x \cos \omega t + y \sin \omega t) (\cos \omega t \vec{e}_y - \sin \omega t \vec{e}_x) \end{aligned}$$

a poté

$$\begin{aligned} d\vec{\mathcal{M}} &= (x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z) \times (\vec{j}_2 \times \vec{B}) dS = \\ &= \gamma_2 \omega B_0^2 (x \cos \omega t + y \sin \omega t) (x \cos \omega t \vec{e}_z + y \sin \omega t \vec{e}_z + \dots) dS = \gamma_2 \omega B_0^2 (x^2 \cos^2 \omega t + y^2 \sin^2 \omega t) \vec{e}_z dS + \dots , \end{aligned}$$

kde ... jsou členy úměrné xz , yz nebo xy , které při integrování vypadnou. Tak s použitím vztahů pro integraci kvadratických funkcí souřadnic po povrchu válce dostáváme

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{1}{2} \gamma_2 \omega B_0^2 a^2 S \vec{e}_z .$$

3. Rámová anténa.

Rovinná lineárně polarizovaná elektromagnetická vlna harmonického průběhu s vlnovou délkou λ a s elektrickou složkou ve směru \vec{e}_z se šíří ve směru \vec{e}_x , přičemž hustota toku energie elektromagnetické vlny je S . Spočítejte napětí naprázdno na svorkách rámové antény tvořené jedním čtvercovým závitem o straně a . Jakou ideální orientaci by měla anténa mít? Rozměry antény jsou zanedbatelné vůči vlnové délce, tj. $a \ll \lambda$.

Řešení. Pro Poyntingův vektor u rovinné vlny dostáváme

$$\vec{S} = -\vec{H} \times \vec{E} = -\frac{1}{\mu_0} \vec{B} \times (-\vec{n} \times c\vec{B}) = \frac{c}{\mu_0} \vec{n} |\vec{B}|^2 .$$

Protože u toku výkonu S není explicitně uveden jeho časový průběh, můžeme předpokládat, že jde o střední hodnotu a ta je pro harmonický průběh rovna $S = \frac{1}{2} S_{\max} = \frac{c}{2\mu_0} B_{\max}^2$, z čehož dostáváme

$$B_{\max} = \sqrt{2\mu_0 c^{-1} S} .$$

Na svorkách rámové antény pak bude podle integrální verze Faradayova zákona elektromagnetické indukce harmonické napětí ($\omega = 2\pi f = \frac{2\pi c}{\lambda}$) s amplitudou

$$U_{\max} = \partial_t \Psi = \omega a^2 B_{\max} = \frac{2\pi c}{\lambda} a^2 \sqrt{2\mu_0 c^{-1} S} .$$

